

# 新型コロナウイルス ワクチン接種に関するお願い

接種したワクチンの種類により、  
献血をご遠慮いただく期間が異なります。

種類	メーカー	接種後以下の期間は 献血をご遠慮下さい
組換えタンパク質	ノババックス (武田薬品工業)	<u>24 時間以内</u>
RNA	ファイザー	<u>48 時間以内</u>
	モデルナ	
	第一三共	
	Meiji Seika ファルマ	
ウイルスベクター	アストラゼネカ	<u>6 週間以内</u>
	J&J (ヤンセンファーマ)	

※国内承認だけではなく、海外で使用されているワクチンを接種された方は、  
献血受付時に職員にお申し出ください。

新型コロナウイルスワクチンに関する詳しい情報は下記アドレスをご確認ください。

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine\\_qa.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html)

(厚生労働省 HP : 「新型コロナウイルスワクチン Q&A」)

# 新型コロナウイルス感染症に関するお願い

## 《献血前》

以下に該当される方は

「献血」をご遠慮いただいております。

- ◆ 新型コロナウイルス感染症と診断された、または新型コロナウイルス検査（PCR または抗原検査）で陽性になったことがあり、**症状軽快から**（無症状の場合は陽性となった検査の検体採取日から）**2週間以内の方**
- ◆ 発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含む新型コロナウイルス感染症が疑われる**症状出現日から2週間以内の方**及び**症状軽快から3日以内の方**
- ◆ 同居されている方が新型コロナウイルス感染者に該当し、発症日から**1週間以内の方**

## 《献血後》

献血にご協力いただいた方へ

**以下に当てはまる場合は、献血日、氏名、生年月日を、できるだけ早く血液センターにご連絡をお願いします。**

- 献血後2週間以内に
  - ① 「新型コロナウイルス感染症」と診断された、または新型コロナウイルス検査(PCR または抗原検査)が陽性になった。
  - ② 発熱及び咳・呼吸困難などの呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状があった。
- 献血翌日までに同居されている方が新型コロナウイルス感染者または疑う症状があった。

症状の発生状況等もお聞きすることがあります。

ご連絡をいただいた方のプライバシーは確実に守られますのでご安心ください。

各血液センターお問い合わせの一覧はこちらから  
<https://www.jrc.or.jp/about/search/bloodcenter>

